



ГРАФІЧНЕ ТА СХЕМАТИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛІВ


Алгоритм зовнішнього лікування хворих на atopічний дерматит






Алгоритм лікування хворих на ПА стосовно ступенів тяжкості

Алгоритм лікування хворих на оніхомікози




Алгоритм зовнішнього лікування хворих на псоріаз



Алгоритм зовнішнього лікування звичайного псоріазу

ЗВИЧАЙНИЙ ПСОРІАЗ

Карбодерм



Ураження волосної частини голови

Ураження долоней та підшов

Примітка: при виникненні настійної косметичної необхідності, насамперед професійної (актери, лікарі, педагоги тощо) на відкриті ділянки тіла (обличчя 5–7 днів, руки 7–10 днів – “Тримістин”, а в особливо завзятих випадках крем “Бетаметазону валерат”).


Алгоритм зовнішнього лікування псоріазу волосяної частини голови

ПСОРИАЗ ВОЛОСЯНОЇ ЧАСТИНИ ГОЛОВИ



Алгоритм зовнішнього лікування долонно-підшовового псоріазу

ДОЛОННО-ПІДОШВОВИЙ ПСОРИАЗ



Примітка: підтримуюча терапія – крем Карбодерм 5 % періодично по мірі появи гіперкератозу

Алгоритм зовнішнього лікування ексудативних форм псоріазу


ЕКСУДАТИВНИЙ ПСОРИАЗ



рясний ексудат просочує лусочки, склеюючи їх у корки, після відторгнення яких виявляється червонувата волога, іноді поверхня, що кровоточить. Особливо тяжко перебігає у шкірних складках, де можуть виникати вегетації



Примітка: у разі ускладнення вторинною інфекцією при виражених запальних проявах – Тримістин, при помірних запальних проявах – Кортонітол



Основні терапевтичні підходи до лікування хворих на вугрову хворобу

